

Kwai[®] forte 300 mg

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Kwai[®] forte 300mg jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Überzogene Tabletten

LI 111

Zur Anwendung bei Erwachsenen und Heranwachsenden ab 12 Jahre

Wirkstoff: Knoblauchzwiebel-Pulver

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Kwai[®] forte 300mg und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Kwai[®] forte 300mg beachten?
3. Wie ist Kwai[®] forte 300mg einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Kwai[®] forte 300mg aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. Was ist Kwai[®] forte 300mg und wofür wird es angewendet?

Kwai[®] forte 300mg ist ein pflanzliches Arzneimittel bei Gefäßerkrankungen.

Kwai[®] forte 300mg wird angewendet: Zur Vorbeugung der allgemeinen Arterienverkalkung (allgemeine Arteriosklerose).

2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Kwai[®] forte 300mg beachten?

Kwai[®] forte 300mg darf nicht eingenommen werden

- bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Knoblauch oder einen der sonstigen Bestandteile des Arzneimittels.
- bei Blutgerinnungsstörungen im Sinne einer vermehrten Blutungsneigung.

Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Kwai[®] forte 300mg ist erforderlich

– bei Kindern:

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Kindern liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Es soll deshalb bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

– in Schwangerschaft und Stillzeit:

Aus der verbreiteten Anwendung von Knoblauch als Lebensmittel haben sich bisher keine Anhaltspunkte für Risiken in Schwangerschaft und Stillzeit ergeben. Es ist bekannt, dass Knoblauchsubstanzen in die Muttermilch übergehen können; weitere Ergebnisse zusätzlicher Untersuchungen liegen nicht vor. Die Anwendung des Arzneimittels in der Schwangerschaft und Stillzeit wird daher nicht empfohlen.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Kwai[®] forte 300mg:

Dieses Arzneimittel enthält Lactose und Saccharose.

Bitte nehmen Sie Kwai[®] forte 300mg erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Wann dürfen Sie Kwai[®] forte 300mg erst nach Rücksprache mit einem Arzt einnehmen?

Sie dürfen Kwai[®] forte 300mg erst nach Rücksprache mit dem Arzt einnehmen

- bei gleichzeitiger Einnahme von blutgerinnungshemmenden Arzneimitteln vom Cumarin-Typ (Phenprocoumon, Warfarin), da deren Wirkung durch Kwai[®] forte 300mg verstärkt werden kann und eventuell die Dosierung angepasst werden muss. Daher sollten bei gleichzeitiger Einnahme engmaschig Kontrollen der Gerinnungsparameter bis zu 14 Tage nach Absetzen von Kwai[®] forte 300mg erfolgen.

- bei gleichzeitiger Einnahme von blutgerinnungshemmenden Arzneimitteln wie Acetylsalicylsäure (Thrombozytenaggregationshemmer).

- bei gleichzeitiger Einnahme von Saquinavir (ein Medikament zur Behandlung der HIV („AIDS“-)Infektion), da nicht ausgeschlossen werden kann, dass bei gleichzeitiger Einnahme dessen Wirksamkeit vermindert wird. Daher sollten bei gleichzeitiger Einnahme regelmäßig geeignete Therapiekontrollen für die Anti-HIV-Medikation bis zu 14 Tage nach Absetzen von Kwai[®] forte 300mg erfolgen.

Welche weiteren Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten?

Bei gleichzeitiger Einnahme von Kwai[®] forte 300mg mit blutdrucksenkenden Medikamenten sollten regelmäßig Therapiekontrollen bis zu 14 Tage nach Absetzen von Kwai[®] forte 300mg erfolgen, da die blutdrucksenkende Wirkung verstärkt werden kann.

Da Kwai[®] forte 300mg die Gerinnungsfähigkeit des Blutes herabsetzen kann, muss es vor einer Operation abgesetzt werden. Informieren Sie bitte rechtzeitig Ihren Arzt, der über das weitere Vorgehen entscheidet.

Es liegen keine ausreichenden Untersuchungen zur Verringerung des Auftretens von arteriosklerotisch bedingten Ereignissen wie z.B. Herzinfarkt, Schlaganfall oder arterielle Verschlusskrankheit der Beine (AVK, Claudicatio intermittens) vor.

Bei Einnahme von Kwai[®] forte 300mg mit anderen Arzneimitteln:

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor Kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Welche anderen Arzneimittel beeinflussen die Wirkung von Kwai[®] forte 300mg oder werden selbst in ihrer Wirkung durch Kwai[®] forte 300mg beeinflusst?

Bei gleichzeitiger Einnahme von Kwai[®] forte 300mg kann die Wirkung der folgenden Medikamente verstärkt werden:

- blutgerinnungshemmende Medikamente wie Cumarinabkömmlinge (Phenprocoumon, Warfarin) und Acetylsalicylsäure (Thrombozytenaggregationshemmer)
- blutdrucksenkende Arzneimittel.

Bei gleichzeitiger Einnahme von Kwai[®] forte 300mg kann die Wirkung des folgenden Medikamentes abgeschwächt werden:

- Saquinavir (ein Medikament zur Behandlung der HIV („AIDS“-)Infektion). Für höhere Dosen von Knoblauchzubereitungen ist beschrieben, dass bei gleichzeitiger Einnahme von Saquinavir dessen Wirksamkeit vermindert wird. Inwieweit dies für die empfohlene Dosierung von Kwai[®] forte 300mg von Bedeutung ist, bedarf weiterer Untersuchungen.

Beachten Sie bitte, dass diese Angaben auch für die genannten Arzneimittel gelten können, wenn deren Anwendung wenige Stunden oder Tage zurückliegt.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

3. Wie ist Kwai[®] forte 300mg einzunehmen?

Nehmen Sie Kwai[®] forte 300mg immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Soweit nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene und Heranwachsende ab 12 Jahre 3-mal täglich 1 überzogene Tablette ein.

Nehmen Sie Kwai[®] forte 300mg unzerkaut mit ausreichend Flüssigkeit (z. B. 1 Glas Wasser) morgens, mittags und abends, am besten zu den Mahlzeiten ein.

Grundsätzlich ist die Anwendungsdauer zeitlich nicht begrenzt. Beachten Sie jedoch bitte die Angaben unter Gegenanzeigen, Vorsichtsmaßnahmen, Wechselwirkungen und Nebenwirkungen.

Wenn Sie eine größere Menge Kwai[®] forte 300mg eingenommen haben als Sie sollten:

Bei Einnahme zu großer Mengen von Knoblauchzwiebel-Pulver ist mit einem verstärkten Auftreten der Nebenwirkungen, insbesondere von Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit, Erbrechen und Durchfall zu rechnen. Da die Gerinnungsfähigkeit des Blutes herabgesetzt werden kann, können in Einzelfällen Blutungen auftreten. Bei einer erheblichen Überdosierung von Kwai[®] forte 300mg sollte daher ein Arzt benachrichtigt werden, der über die im Einzelnen notwendigen Maßnahmen entscheidet wird.

Wenn Sie die Einnahme von Kwai[®] forte 300mg vergessen haben:

Setzen Sie die Behandlung gemäß der Dosierungsanleitung bzw. wie vom Arzt verordnet fort. Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie die Einnahme von Kwai[®] forte 300mg unterbrechen oder vorzeitig beenden:

Eine Unterbrechung oder vorzeitige Beendigung der Behandlung mit Kwai[®] forte 300mg ist in der Regel unbedenklich. Gegebenenfalls sollte eine Rücksprache mit dem behandelnden Arzt erfolgen.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Kwai[®] forte 300mg Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei Jedem auftreten müssen.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Verwendete Schriften: Helvetica LT 55 Helvetica LT 75 VAG Rounded Bold		Sachbearbeiter G+G Andreas Ueberschär überprüft durch: Andreas Ueberschär		Geprüft durch PPC: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein EAN lesbar: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein		Seite: 1 von 2	
Datum: 10.02.2015 Versions-Nr.: 06		Prüfung und Freigabe Köln: <input type="checkbox"/> Frei <input type="checkbox"/> Neuer Abzug erforderlich		Prüfung und Freigabe Berlin: <input type="checkbox"/> Frei <input type="checkbox"/> Neuer Abzug erforderlich			
Lackausparnung: I)- II)- III)-		148 x 420 mm		Schwarz		45°	
Größe:		Material:		Druckfarbe/ Winklung bei einer Rasterweite von 150 lpi			
Bezeichnung: GI Kwai forte 300 mg		Inhalt:		Artikel-Nr.: 556053		Land: Deutschland	
				Teile-Nr.: 24.003.540			
				Druck-Kennz.: 02P0115			
				Laetus-Code: 23			
				EAN-Code:			
				PZN-Code:			

Sehr häufig:	mehr als 1 Behandelte von 10
Häufig:	1 bis 10 Behandelte von 100
Gelegentlich:	1 bis 10 Behandelte von 1.000
Selten:	1 bis 10 Behandelte von 10.000
Sehr selten:	weniger als 1 Behandelte von 10.000
Nicht bekannt:	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Welche Nebenwirkungen können bei der Einnahme von Kwai® forte 300mg auftreten?
Häufig können Magen-Darm-Beschwerden, insbesondere Aufstoßen und Übelkeit auftreten. Selten können Überempfindlichkeitsreaktionen (Hautausschlag, Asthma) auftreten. Sehr selten kann es zum Auftreten von Blutungen kommen.
Hinweis: Durch die Einnahme von Kwai® forte 300mg kann sich der Geruch von Haut und Atemluft verändern. Eine Senkung des Blutdrucks ist möglich.

Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?
Bei den ersten Anzeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion oder bei schweren Nebenwirkungen, insbesondere beim Auftreten von Blutungen dürfen Sie Kwai® forte 300mg nicht nochmals einnehmen. Informieren Sie einen Arzt, damit dieser über den Schweregrad und gegebenenfalls erforderliche weitere Maßnahmen entscheiden kann.

Meldung von Nebenwirkungen
Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de, anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Kwai® forte 300mg aufzubewahren?
Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und dem Behältnis (Durchdruckpackung) angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Aufbewahrungsbedingungen:
Nicht über 25°C aufbewahren. In der Originalverpackung aufbewahren um den Inhalt vor Feuchtigkeit zu schützen.

6. Weitere Informationen
Was Kwai® forte 300mg enthält:
Der Wirkstoff ist: Knoblauchzwiebel-Pulver
Eine überzogene Tablette enthält 300mg Knoblauchzwiebel-Pulver

Die sonstigen Bestandteile sind:
Sucrose (Saccharose), Lactose-Monohydrat, Talkum, Hypromellose, Rizinusöl, Cellulosepulver, hochdisperses Siliciumdioxid, Macrogol 6000, Povidon, Magnesiumstearat (Ph. Eur.), Gelatine, Chinolingelb, Aluminiumsalz (E 104), Indigocarmin, Aluminiumsalz (E 132), Carnaubawachs, gebleichtes Wachs

Hinweis: Kwai® forte 300mg überzogene Tabletten verändern den Zuckerstoffwechsel nicht und sind daher auch für Diabetiker geeignet. Eine überzogene Tablette entspricht 0,03 BE.

Wie Kwai® forte 300mg aussieht und Inhalt der Packung:
Kwai® forte 300mg sind runde, hellgrüne überzogene Tabletten.

Kwai® forte 300mg ist in Originalpackungen zu 60 und 180 überzogenen Tabletten erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer
Cassella-med GmbH & Co. KG
Gereonsmühlengasse 1
50670 Köln

Hersteller
Klosterfrau Berlin GmbH
Motzener Straße 41
12277 Berlin

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im November 2014

Zul.-Nr.: 41867.00.00

Liebe Verwenderin, lieber Verwender,

Was bewirkt Kwai® forte 300mg?

Kwai® forte 300mg wirkt vorbeugend gegen allgemeine Arterienverkalkung (allgemeine Arteriosklerose). Die allgemeine Arterienverkalkung hat zur Folge, dass sich die Arterien durch Ablagerungen verengen und dadurch steif und hart werden. Kwai® forte 300mg hilft, dieser Entwicklung vorzubeugen.

Welcher Knoblauch wird für die Herstellung von Kwai® forte 300mg verwendet?

Für Kwai® forte 300mg wird chinesischer Knoblauch verwendet. Das daraus hergestellte Knoblauchzwiebel-Pulver trägt unsere Bezeichnung „LI 111“, die ein besonderes Gütezeichen darstellt. Der Anbau erfolgt unter kontrollierten Bedingungen. Ernte und Verarbeitung unterliegen ständigen Qualitätskontrollen. Bei unserem Herstellungsverfahren wird dem wirkstoffreichen Frischknoblauch durch unsere schonende Trocknung lediglich das Wasser entzogen, so dass alle Inhaltsstoffe des Frischknoblauchs in Kwai® forte 300mg enthalten sind.

Haben Sie weitere Fragen?

Sollte eine für Sie wichtige Frage nicht ausreichend beantwortet worden sein – schreiben Sie uns. Und schildern Sie uns bitte auch weiterhin Ihre Erfahrungen mit Kwai® forte 300mg. Mit der Beantwortung der folgenden Fragen helfen Sie uns, auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse noch besser eingehen zu können. Wir versichern Ihnen, die Daten nicht an Dritte weiterzugeben und die strengen Datenschutz-Auflagen zu beachten.

Für Ihre Mühe bedanken wir uns herzlich und wünschen Ihnen gute Gesundheit.

Ihre Cassella-med

<p>1. Seit wann verwenden Sie Kwai® forte 300mg?</p> <p>Zum ersten Mal <input type="checkbox"/></p> <p>Seit: _____ <input type="checkbox"/></p>	<p>4. Welche Packungsgröße haben Sie gekauft?</p> <p>60er <input type="checkbox"/> 180er <input type="checkbox"/></p> <p>Sie sind ...</p> <p>weiblich <input type="checkbox"/> männlich <input type="checkbox"/></p> <p>und _____ Jahre alt.</p>
<p>2. Woher kennen Sie Kwai® forte 300mg?</p> <p>Aus der Apotheke <input type="checkbox"/></p> <p>Vom Heilpraktiker/Arzt <input type="checkbox"/></p> <p>Von Bekannten/Verwandten <input type="checkbox"/></p> <p>Aus einem Zeitungsartikel <input type="checkbox"/></p> <p>Aus einem Fernsehbericht <input type="checkbox"/></p> <p>Aus einem Rundfunkbericht <input type="checkbox"/></p> <p>_____</p>	<p>5. Welche Erfahrungen haben Sie mit Kwai® forte 300mg gemacht?</p> <p>_____</p>
<p>3. Warum verwenden Sie Kwai® forte 300mg?</p> <p>Gegen allgemeine Arterienverkalkung <input type="checkbox"/></p> <p>Zur Vorbeugung <input type="checkbox"/></p> <p>Weil ich Raucher bin <input type="checkbox"/></p> <p>Weil ich Diabetiker bin <input type="checkbox"/></p> <p>Wegen meiner Blutgefäße <input type="checkbox"/></p> <p>Andere Gründe: <input type="checkbox"/></p> <p>_____</p>	<p>6. Haben Sie Vorschläge, die wichtig für uns sein könnten?</p> <p>Bitte informieren Sie mich in Zukunft über neue Erkenntnisse zu Kwai® forte 300mg:</p> <p>Vor-/Zuname _____</p> <p>Straße _____</p> <p>PLZ/Ort _____</p>

Bitte schicken Sie diesen Abschnitt an:

Cassella-med Kundenberatung
Stichwort: **Kwai**
Postfach 10 06 24
50446 Köln

Unser Service-Team berät Sie gern unter:

E-Mail: dialog@cassella-med.eu
www.kwai.de
Tel.: 0800/16 52-500
Fax: 0800/16 52-700



Verwendete Schriften: Helvetica LT 55 Helvetica LT 75 VAG Rounded Bold	Sachbearbeiter G+G Andreas Ueberschär überprüft durch: Andreas Ueberschär	Geprüft durch PPC: <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein EAN lesbar: <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein	Seite: 2 von 2
Datum: 10.02.2015 Versions-Nr.: 06	Prüfung und Freigabe Köln: <input type="checkbox"/> Frei <input type="checkbox"/> Neuer Abzug erforderlich	Prüfung und Freigabe Berlin: <input type="checkbox"/> Frei <input type="checkbox"/> Neuer Abzug erforderlich	
Lackausparung: I)- II)- III)-	Größe: 148 x 420 mm	Material: Schwarz	Druckfarbe/ Winklung bei einer Rasterweite von 150 lpi: 45°
Bezeichnung: GI Kwai forte 300 mg	Inhalt: 556053	Artikel-Nr.: 24 003 540	Druck-Kennz.: 02P0115
Land: Deutschland	Laetus-Code: 23	EAN-Code:	PZN-Code: